

ネギ

病害虫発生状況

- | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 さび病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 2 黒斑病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 3 ベト病 | | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 4 えそ条斑病 | 「小株」：発生を認めなかった（例年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 5 アブラムシ類 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | |
| 6 シロイチモジヨトウ | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 7 ハスモンヨトウ | | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 8 ネギハモグリバエ | 「小株」：平年比やや少なかった。 | 「大株」：例年比やや少なかった。 |
| 9 ネギアザミウマ | 「小株」：平年並であった。 | 「大株」：例年並であった。 |
| 10 その他の病害虫 | 「小株」：発生を認めなかった。 | 「大株」：発生を認めなかった。 |

小株ネギ(葉長40cm未満)調査結果(25株調査)

調査日：令和4年11月16日

調査場所		さび病	黒斑病	えそ条斑病	アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)	
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	虫数 (/株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (/株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)		被害度
京都市伏見区 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	12.0	3.0	24.0	
八幡市 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	8.0	2.0	39.0	
" ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	100.0	51.0	28.0	
" ③		0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	4.0	1.0	5.0	34.0	
平均	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	1.0	0.3	35.0	15.3	31.3
	平年(例年)比	並	並	(並)	(並)	並	並	並	並	少	少	並	並	—
	平年(例年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.001	0.1	0.00	0.1	18.6	4.8	41.2	11.7	28.2
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.008	0.8	0.00	0.0	0.8	0.2	7.2	1.8	31.4
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.01	1.3	2.7	0.7	11.3	2.8	30.8
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	12.0	3.0	35.3	8.8	33.8
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	60.0	15.0	82.7	21.0	22.7
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	11.0	2.8	5.0	1.3	28.0
	H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	16.8	4.6	50.4	12.6	29.4
	H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	4.0	1.0	40.0	23.3	26.7
	H26年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	3.0	1.0	92.0	23.0	23.8
H25年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	64.0	17.0	69.0	18.0	31.0	
H24年	0.0	0.0	—	—	0.000	0.0	0.00	0.0	12.0	3.0	19.0	4.8	24.8	
発生 ほ場率	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	—	100.0	—	—	
	平年(例年)比	並	並	(並)	(並)	並	並	並	並	並	並	並	—	
	平年(例年)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	—	3.3	—	50.5	—	79.4	—	
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	—	0.0	—	20.0	—	40.0	—	
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	33.3	—	16.7	—	66.7	—	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	16.7	—	100.0	—	
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	66.7	—	100.0	—	
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	50.0	—	50.0	—	
	H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	60.0	—	100.0	—	
	H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	100.0	—	100.0	—	
	H26年	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	50.0	—	100.0	—	
H25年	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	100.0	—	100.0	—		
H24年	0.0	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	25.0	—	37.5	—		

大株ネギ(葉長40cm以上)調査結果(25株調査)

調査日：令和4年11月16日

調査場所		さび病	黒斑病	べと病	えそ条斑病	シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)	
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (/株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度		
京都市西京区牛ヶ瀬		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	4.0	88.0	22.0	56.0
京都市南区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	60.0	15.0	48.0
京都市伏見区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	11.0	62.0
八幡市 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	43.0
" ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	56.0
平均	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.0	40.8	10.2	53.0
	平年(例年)比	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(やや少)	(やや少)	(並)	(並)	—
	平年(例年)	0.1	1.4	0.0	0.6	0.1	0.00	0.0	0.4	0.0	0.0	16.2	4.0	40.1	14.2	52.2
	R3年	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	2.0	47.8
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	5.6	1.4	49.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	3.3	37.0	9.3	54.8
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	6.0	62.7	17.7	48.3
	H29年	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	1.6	26.5	6.6	54.9
	H28年	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	33.0	8.3	46.0	13.3	58.6
	H27年	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	34.7	8.7	96.0	49.0	51.7
	H26年	0.0	2.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	52.5
発生 ほ場率	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	—	100.0	—	—	
	平年(例年)比	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(やや少)	(並)	(並)	—		
	平年(例年)	2.1	10.4	0.0	7.1	—	10.0	—	10.0	—	0.0	50.5	—	78.8		
	R3年	16.7	0.0	0.0	0.0	—	50.0	—	50.0	—	0.0	0.0	—	50.0		
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	20.0	—	60.0		
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	50.0	—	75.0		
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	66.7	—	66.7		
	H29年	0.0	0.0	0.0	50.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	50.0	—	100.0		
	H28年	0.0	25.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	0.0	100.0	—	100.0		
	H27年	0.0	33.3	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	0.0	66.7	—	100.0		
	H26年	0.0	25.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—		

(程度別基準)

調査項目	無	少	中	多	甚
さび病 発病株率	0	~20	~40	~60	~100
アブラムシ類 寄生株率	0	~25	~50	~75	~100
ネギハモグリバエ 被害率(程度)	0	~25	~50	~75	~100
ネギアザミウマ 被害率(程度)	0	~25	~50	~75	~100

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害度 = (4A + 3B + 2C + D) / (25 × 4) × 100

- A : 1株被害率率 ~100%
- B : 1株被害率率 ~50%
- C : 1株被害率率 ~30%
- D : 1株被害率率 ~10%

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

- 発病程度A : 全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
- 発病程度B : 全葉面積の21~30%に病斑が認められる。
- 発病程度C : 全葉面積の11~20%に病斑が認められる。
- 発病程度D : 全葉面積の1~10%に病斑が認められる。
- 発病程度E : 病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{4A + 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$