

ネギ

病害虫発生状況

- | | | |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 1 さび病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：例年比やや多かった。 |
| 2 黒斑病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：例年比やや多かった。 |
| 3 べと病 | 「小株」：調査外で発生を認めた（ほ場率14.3%） | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 4 えそ条斑病 | 「小株」：例年比やや少なかった。 | 「大株」：例年比やや多かった。 |
| 5 アブラムシ類 | 「小株」：平年比やや多かった。 | |
| 6 シロイチモジトウ | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 7 ハスモンヨトウ | | 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。 |
| 8 ネギハモグリバエ | 「小株」：平年並であった。 | 「大株」：例年比やや少なかった。 |
| 9 ネギアザミウマ | 「小株」：平年並であった。 | 「大株」：例年比やや少なかった。 |
| 10 その他の病害虫 | 「小株」：発生を認めなかった。 | 「大株」：発生を認めなかった。 |

小株ネギ(葉長40cm未満)調査結果(25株調査)

調査日：令和5年6月14、15日

調査場所	さび病		黒斑病		えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)		
	発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	虫数 (/株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (/株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度			
京都市南区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	4.0	0.00	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	100.0	28.0	21.0
京都市伏見区 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	7.0	37.0
〃 ②	0.0	0.0	16.0	4.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4.0	1.0	100.0	25.0	36.0	36.0	36.0
〃 ③	0.0	0.0	20.0	5.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	37.0	37.0	37.0
八幡市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0	23.0	18.0
〃 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	27.0	27.0	27.0
〃 ③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
平均	R5年	0.0	0.0	5.1	1.3	0.01	0.6	0.00	0.0	0.0	1.7	0.4	88.6	22.6	28.7	28.7	28.7
	平年(例年)比	並	並	(少)	(少)	やや多	やや多	並	並	並	並	並	並	やや少	29.9	29.9	29.9
	例年	0.3	0.1	30.9	8.5	0.00	0.3	0.00	0.0	0.0	17.3	4.8	90.4	34.3	29.9	29.9	29.9
	R4年	0.0	0.0	12.0	4.3	0.02	2.0	0.00	0.0	0.0	1.0	0.3	54.0	13.5	28.3	28.3	28.3
	R3年	1.5	0.0	7.0	2.8	0.02	1.0	0.00	0.0	0.0	1.0	0.3	82.5	26.5	34.3	34.3	34.3
	R2年	0.0	0.0	55.2	15.6	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	27.4	35.0	35.0	35.0
	R元年	0.0	0.0	42.4	12.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	7.2	1.8	100.0	28.4	36.4	36.4	36.4
	H30年	0.0	0.0	25.6	6.4	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	29.6	30.6	30.6	30.6
	H29年	1.6	0.0	6.4	1.6	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	22.4	6.4	98.4	36.4	23.6	23.6	23.6
	H28年	0.0	0.0	68.0	17.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	15.2	3.8	99.2	39.2	35.0	35.0	35.0
H27年	0.0	0.0	—	—	—	—	0.00	0.0	0.0	10.4	3.0	89.6	57.6	25.4	25.4	25.4	
H26年	0.0	0.0	—	—	—	—	0.00	0.0	0.0	52.0	15.5	81.0	37.5	24.5	24.5	24.5	
H25年	0.0	0.5	—	—	—	—	0.00	0.0	0.00	64.0	16.8	99.0	47.0	26.1	26.1	26.1	
発生 ほ場率 (%)	R5年	0.0	0.0	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	平年(例年)比	並	並	(やや少)	(やや多)	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	例年	4.5	1.3	77.9	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R4年	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R3年	25.0	0.0	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R2年	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R元年	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	H30年	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	H29年	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	H28年	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
H27年	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
H26年	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
H25年	0.0	12.5	—	—	—	—	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

大株ネギ(葉長40cm以上)調査結果(25株調査)

調査日：令和5年6月14、15日

調査場所	さび病		黒斑病		べと病		えそ条斑病		シロイチモジトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)	
	発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (/株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度			
京都市西京区	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	4.0	1.0	63.0
京都市伏見区 ①	4.0	8.0	0.0	16.0	4.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	55.0	55.0	55.0
〃 ②	20.0	0.0	0.0	88.0	27.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	17.0	62.0	62.0	62.0
〃 ③	4.0	0.0	0.0	48.0	14.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	52.0	52.0	52.0
八幡市 ①	4.0	0.0	0.0	88.0	22.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	16.0	61.0	61.0	61.0
〃 ②	0.0	0.0	0.0	56.0	14.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	21.0	67.0	67.0	67.0
〃 ③	4.0	0.0	0.0	48.0	12.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	43.0	43.0	43.0
平均	R5年	5.7	1.1	0.0	49.1	13.3	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	74.3	18.6	57.6	57.6	57.6
	例年比	(並)	(やや多)	(並)	(やや多)	(やや多)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(やや少)	(やや少)	(やや少)	(やや少)	(やや少)	(やや少)	(やや少)
	例年	11.9	5.8	2.2	36.7	8.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.5	91.8	29.5	54.2	54.2	54.2
	R4年	0.5	0.0	0.0	27.0	6.8	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.5	18.4	50.4	50.4	50.4
	R3年	6.5	0.0	0.0	13.0	4.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	18.4	52.6	52.6	52.6
	R2年	0.0	0.0	0.0	36.7	9.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	100.0	28.3	47.8	47.8	47.8
	R元年	0.0	0.0	0.0	52.7	14.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	2.8	100.0	36.8	55.2	55.2	55.2
	H30年	4.6	0.0	0.0	21.7	5.4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	100.0	32.0	54.2	54.2	54.2
	H29年	7.2	0.0	0.0	38.4	9.6	0.0	0.0	—	—	—	—	15.2	4.0	100.0	31.0	51.2	51.2	51.2
	H28年	59.2	0.0	20.0	75.2	20.2	—	—	—	—	—	—	7.2	1.8	99.2	41.8	68.6	68.6	68.6
H27年	3.0	0.0	0.0	65.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1
H26年	26.0	52.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8
発生 ほ場率 (%)	R5年	85.7	14.3	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	例年比	(多)	(やや多)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(やや少)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)	(並)
	例年	33.2	11.1	2.2	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R4年	12.5	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R3年	37.5	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R2年	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R元年	14.3	0.0	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	H30年	14.3	0.0	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	H29年	40.0	0.0	0.0	100.0	0.0	—	—	—	—	—	—	40.0						