

ネギ

病害虫発生状況

- さび病・・・ 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- 黒斑病・・・ 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- べと病・・・ 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。
- えそ条斑病・・・ 「小株」：例年比やや少なかった。「大株」：例年比やや少なかった。
- アブラムシ類・・・ 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。
- シロイチモジヨトウ・・・ 「小株」：平年比やや多かった。「大株」：例年比やや多かった。
- ハスモンヨトウ・・・ 「大株」：発生を認めなかった（例年並）。
- ネギハマグリバエ・・・ 「小株」：平年並の発生であった。「大株」：例年並の発生であった。
- ネギアザミウマ・・・ 「小株」：平年比やや少なかった。「大株」：例年比少なかった。
- その他の病害虫・・・ 発生を認めなかった。

小株ネギ(葉長40cm未満) 調査結果 (25株調査)

調査日：令和6年7月11、12、17日

調査場所	さび病		黒斑病		えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハマグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	
京都市西京区 ①	0.0	0.0	4.0	1.0	0.00	0.0	0.000	0.0	4.0	1.0	100.0	25.0	34.0		
” ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	30.0		
京都市伏見区 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.240	16.0	4.0	1.0	4.0	1.0	39.0		
” ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	20.0	5.0	28.0		
八幡市 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	16.0	4.0	30.0		
” ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	52.0	13.0	28.0		
平均	R6年	0.0	0.0	0.7	0.2	0.00	0.0	0.040	2.7	1.3	0.3	48.7	12.2	31.5	
	平年(例年)比	並	並	(やや少)	(やや少)	並	並	多	並	並	並	やや少	やや少		
	平年(例年)	0.1	3.4	(9.1)	(2.3)	0.00	0.0	0.015	1.5	11.0	2.9	69.5	21.7	30.0	
	R5年	0.0	0.0	2.0	0.5	0.00	0.0	0.027	2.7	1.3	0.3	60.3	15.0	32.7	
	R4年	0.0	0.0	0.7	0.2	0.00	0.0	0.047	2.7	0.0	0.0	32.7	8.2	28.5	
	R3年	0.7	0.0	4.0	1.0	0.00	0.0	0.027	1.3	0.0	0.0	62.7	16.5	31.2	
	R2年	0.0	0.0	8.0	2.0	0.00	0.0	0.000	0.0	2.0	0.5	79.3	19.8	28.2	
	R元年	0.0	0.0	12.6	3.1	0.00	0.0	0.017	5.1	0.0	0.0	59.4	14.9	26.3	
	H30年	0.0	0.0	9.0	2.3	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	54.0	14.3	25.3	
	H29年	0.0	0.0	13.0	3.3	0.00	0.0	0.030	3.0	2.0	0.5	89.0	22.3	29.3	
	H28年	0.0	0.0	33.0	8.5	0.00	0.0	0.000	0.0	27.0	7.3	89.0	45.8	32.8	
	H27年	0.0	34.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	52.0	13.0	97.0	34.5	37.5	
H26年	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.000	0.0	26.0	7.8	72.0	26.0	28.3		
発生 ほ場率	R6年	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	100.0					
	平年(例年)比	並	並	(やや少)	並	並	並	並	並	並	並	並	並		
	平年(例年)	1.7	7.5	(47.4)	0.0	0.0	0.0	18.2	30.8	96.1					
	R5年	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	100.0					
	R4年	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0					
	R3年	16.7	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	100.0					
	R2年	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	100.0					
	R元年	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0	85.7					
	H30年	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	75.0					
	H29年	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0					
	H28年	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0					
	H27年	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	100.0					
H26年	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0						

大株ネギ(葉長40cm以上) 調査結果 (25株調査)

調査日：令和6年7月11、12、17日

調査場所	さび病		黒斑病		べと病		えそ条斑病		シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハマグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度		
京都市西京区 ①	0.0	0.0	0.0	20.0	5.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	52.0
” ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	24.0	6.0	51.0		
京都市伏見区 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0		
” ②	0.0	0.0	0.0	16.0	4.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	21.0	44.0		
八幡市 ①	0.0	0.0	0.0	16.0	4.0	0.040	4.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	8.0	53.0		
平均	R6年	0.0	0.0	0.0	10.4	2.6	0.008	0.8	4.8	0.0	0.0	0.8	0.2	48.0	12.0	50.0		
	平年(例年)比	並	並	並	(並)	(やや少)	(並)	(並)	(やや多)	並	並	(並)	(並)	(少)	(少)			
	平年(例年)	1.3	10.8	2.9	(25.7)	(6.4)	(0.015)	(1.1)	(1.9)	0.0	0.0	(9.3)	(2.4)	(78.5)	(21.8)	56.2		
	R5年	0.0	0.0	0.7	6.7	1.7	0.073	3.3	6.0	0.0	0.0	2.0	0.5	54.0	13.5	50.0		
	R4年	0.0	4.0	0.0	15.4	3.9	0.046	3.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	12.4	49.7		
	R3年	0.0	0.0	6.3	8.0	2.0	0.034	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	13.6	53.7		
	R2年	0.0	0.0	0.0	12.7	3.2	0.000	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.2	77.3	19.3	55.3		
	R元年	0.0	0.0	0.0	25.1	6.3	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	16.3	60.0		
	H30年	0.0	0.0	0.0	39.2	9.8	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.6	100.0	25.0	52.3		
	H29年	0.0	2.3	0.0	45.1	11.3	0.010	0.6	—	0.0	0.0	2.9	0.7	98.3	32.7	58.1		
	H28年	10.7	5.3	20.0	60.0	15.0	—	—	—	0.0	0.0	20.0	5.0	98.3	33.7	56.3		
	H27年	1.3	49.3	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	0.0	45.3	11.3	85.3	21.3	58.3		
H26年	0.0	36.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	62.3		
発生 ほ場率	R6年	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	20.0	80.0						
	平年(例年)比	並	並	並	(やや少)	(やや多)	(並)	(やや多)	(並)	(並)	(並)	(少)	(少)					
	平年(例年)	11.1	34.4	6.4	(76.2)	(16.7)	(0.015)	(1.1)	(1.9)	0.0	0.0	(39.5)	(100.0)					
	R5年	0.0	0.0	16.7	66.7	71.4	33.3	50.0	0.0	0.0	16.7	83.3						
	R4年	0.0	28.6	0.0	71.4	57.1	17.1	71.4	0.0	0.0	0.0	100.0						
	R3年	0.0	0.0	28.6	83.3	28.6	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	100.0						
	R2年	0.0	0.0	0.0	83.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0						
	R元年	0.0	0.0	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0						
	H30年	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0						
	H29年	0.0	14.3	28.6	100.0	14.3	—	—	—	0.0	42.9	100.0						
	H28年	66.7	66.7	0.0	100.0	—	—	—	—	0.0	100.0	100.0						
	H27年	33.3	100.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	100.0	100.0						
H26年	0.0	100.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—							

(程度別基準)

調査項目	無	少	中	多	甚
さび病 発病株率	0	~2.0	~4.0	~6.0	~10.0
アブラムシ類 寄生株率	0	~2.5	~5.0	~7.5	~10.0
ネギハマグリバエ 被害率(程度)	0	~2.5	~5.0	~7.5	~10.0
ネギアザミウマ 被害率(程度)	0	~2.5	~5.0	~7.5	~10.0

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害率 = (4A + 3B + 2C + D) / (25 × 4) × 100

- A : 1株被害率率 ~100%
- B : 1株被害率率 ~50%
- C : 1株被害率率 ~30%
- D : 1株被害率率 ~10%

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

- 発病程度A : 全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
- 発病程度B : 全葉面積の21~30%に病斑が認められる。
- 発病程度C : 全葉面積の11~20%に病斑が認められる。
- 発病程度D : 全葉面積の1~10%に病斑が認められる。
- 発病程度E : 病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{4A + 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$