

ネギ

病害虫発生状況

- | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| 1 さび病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 2 黒斑病 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 3 べと病 | | 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 4 えそ条斑病 | 「小株」：平年比やや多かった。 | 「大株」：平年比多かった。 |
| 5 アブラムシ類 | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | |
| 6 シロイチモジヨトウ | 「小株」：平年比多かった。 | 「大株」：例年比多かった。 |
| 7 ハスモンヨトウ | | 「大株」：発生を認めなかった（平年並）。 |
| 8 ネギハモグリバエ | 「小株」：発生を認めなかった（平年並）。 | 「大株」：発生を認めなかった（平年比やや少）。 |
| 9 ネギアザミウマ | 「小株」：平年比やや多かった。 | 「大株」：平年比多かった。 |
| 10 その他の病害虫 | 「小株」：発生を認めなかった。 | 「大株」：発生を認めなかった。 |

小株ネギ(葉長40cm未満)調査結果(25株調査)

調査日：令和8年7月13、14、16日

調査場所	さび病		黒斑病		えそ条斑病		アブラムシ類		シロイチモジヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)		発病株率 (%)		発病株率 (%)	発病度	虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	
京都市西京区 ①	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	88.0	22.0	18.0
〃 ②	0.0		0.0		0.0	0.0	0.00	0.0	0.040	4.0	0.0	0.0	100.0	53.0	18.0
京都市伏見区 ①	0.0		0.0		16.0	4.0	0.00	0.0	0.400	12.0	0.0	0.0	100.0	26.0	27.0
〃 ②	0.0		0.0		32.0	8.0	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	100.0	44.0	25.0
八幡市	0.0		0.0		8.0	2.0	0.00	0.0	0.040	4.0	0.0	0.0	80.0	20.0	36.0
平 均	R 8 年	0.0	0.0	11.2	2.8	0.00	0.0	0.096	4.0	0.0	0.0	93.6	33.0	24.8	
	平年比	並	並	やや多	やや多	並	並	多	やや多	並	並	多	やや多		
	平 年	0.1	0.0	8.3	2.1	0.00	0.0	0.021	1.9	4.6	1.2	65.1	19.2	29.2	
	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.020	2.0	12.0	3.0	76.0	23.5	26.8	
	R 6 年	0.0	0.0	0.7	0.2	0.00	0.0	0.040	2.7	1.3	0.3	48.7	12.2	31.5	
	R 5 年	0.0	0.0	2.0	0.5	0.00	0.0	0.027	2.7	1.3	0.3	60.3	15.0	32.7	
	R 4 年	0.0	0.0	0.7	0.2	0.00	0.0	0.047	2.7	0.0	0.0	32.7	8.2	28.5	
	R 3 年	0.7	0.0	4.0	1.0	0.00	0.0	0.027	1.3	0.0	0.0	62.7	16.5	31.2	
	R 2 年	0.0	0.0	8.0	2.0	0.00	0.0	0.000	0.0	2.0	0.5	79.3	19.8	28.2	
	R 元年	0.0	0.0	12.6	3.1	0.00	0.0	0.017	5.1	0.0	0.0	59.4	14.9	26.3	
	H 3 0 年	0.0	0.0	9.0	2.3	0.00	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	54.0	14.3	25.3	
	H 2 9 年	0.0	0.0	13.0	3.3	0.00	0.0	0.030	3.0	2.0	0.5	89.0	22.3	29.3	
	H 2 8 年	0.0	0.0	33.0	8.5	0.00	0.0	0.000	0.0	27.0	7.3	89.0	45.8	32.8	
	R 8 年	0.0	0.0	60.0		0.0		60.0		0.0		100.0			
	平年比	並	並	多		並		多		並		並			
	平 年	1.7	0.0	36.8		0.0		24.9		19.2		96.1			
発 生 ほ 場 率	R 7 年	0.0	0.0	0.0		0.0		50.0		25.0		100.0			
	R 6 年	0.0	0.0	16.7		0.0		16.7		33.3		100.0			
	R 5 年	0.0	0.0	33.3		0.0		33.3		16.7		100.0			
	R 4 年	0.0	0.0	16.7		0.0		50.0		0.0		100.0			
	R 3 年	16.7	0.0	50.0		0.0		16.7		0.0		100.0			
	R 2 年	0.0	0.0	50.0		0.0		0.0		16.7		100.0			
	R 元年	0.0	0.0	42.9		0.0		57.1		0.0		85.7			
	H 3 0 年	0.0	0.0	58.3		0.0		25.0		0.0		75.0			
	H 2 9 年	0.0	0.0	50.0		0.0		0.0		50.0		100.0			
	H 2 8 年	0.0	0.0	50.0		0.0		0.0		50.0		100.0			

大株ネギ(葉長40cm以上)調査結果(25株調査)

調査日：令和8年7月13、14、16日

調査場所	さび病		黒斑病		べと病		えそ条斑病		シロイチモジヨトウ			ハスモンヨトウ		ネギハモグリバエ		ネギアザミウマ		葉長 (cm)
	発病株率 (%)		発病株率 (%)		発病株率 (%)	発病度	発病株率 (%)	発病度	幼虫数 (ノ株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)	被害株率 (%)	被害度	被害株率 (%)	被害度	
京都市西京区 ①	0.0		0.0		0.0	48.0	16.0	0.000	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	52.0	47.0
京都市伏見区 ①	0.0		0.0		0.0	64.0	16.0	0.440	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	31.0	42.0
〃 ②	0.0		0.0		0.0	88.0	22.0	0.080	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	38.0	56.0
八幡市	0.0		0.0		0.0	12.0	3.0	3.080	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	41.0
平 均	R 8 年	0.0	0.0	0.0	53.0	14.3	0.900	11.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	36.5	46.5
	平年(例年)比	並	並	並	多	多	(多)	(多)	(多)	並	並	やや少	やや少	多	多			
	平 年(例年)	1.1	1.2	2.7	24.9	6.2	(0.022)	(1.3)	(2.8)	0.0	0.0	3.6	1.0	73.7	21.0	53.5		
	R 7 年	0.0	0.7	0.0	26.0	6.5	0.027	1.3	2.0	0.0	0.0	4.0	1.3	92.0	31.5	49.7		
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	10.4	2.6	0.008	0.8	4.8	0.0	0.0	0.8	0.2	48.0	12.0	50.0		
	R 5 年	0.0	0.0	0.7	6.7	1.7	0.073	3.3	6.0	0.0	0.0	2.0	0.5	54.0	13.5	50.0		
	R 4 年	0.0	4.0	0.0	15.4	3.9	0.046	3.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	12.4	49.7		
	R 3 年	0.0	0.0	6.3	8.0	2.0	0.034	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	13.6	53.7		
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	12.7	3.2	0.000	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.2	77.3	19.3	55.3		
	R 元年	0.0	0.0	0.0	25.1	6.3	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	16.3	60.0		
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	39.2	9.8	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.6	100.0	25.0	52.3		
	H 2 9 年	0.0	2.3	0.0	45.1	11.3	0.0	0.6	—	0.0	0.0	2.9	0.7	98.3	32.7	58.1		
	H 2 8 年	10.7	5.3	20.0	60.0	15.0	—	—	—	0.0	0.0	20.0	5.0	98.3	33.7	56.3		
	R 8 年	0.0	0.0	0.0	100.0		75.0		100.0		0.0		0.0		100.0			
	平年(例年)比	並	並	並	並		(多)	(多)	(多)	並	並	やや少	やや少	並				
	平 年(例年)	6.7	12.6	7.4	83.6		(26.7)	(32.1)	0.0			28.6		96.3				
発 生 ほ 場 率	R 7 年	0.0	16.6	0.0	100.0		66.6		33.3		0.0		33.3		100.0			
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	60.0		40.0		40.0		0.0		20.0		80.0			
	R 5 年	0.0	0.0	16.7	66.7		33.3		50.0		0.0		16.7		83.3			
	R 4 年	0.0	28.6	0.0	71.4		57.1		71.4		0.0		0.0		100.0			
	R 3 年	0.0	0.0	28.6	83.3		28.6		28.6		0.0		0.0		100.0			
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	83.3		0.0		33.3		0.0		33.3		100.0			
	R 元年	0.0	0.0	0.0	71.4		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0			
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	100.0		0.0		0.0		0.0		40.0		100.0			
	H 2 9 年	0.0	14.3	28.6	100.0		14.3		—		0.0		42.9		100.0			
	H 2 8 年	66.7	66.7	0.0	100.0		—		—		0.0		100.0		100.0			

(程度別基準)

	調査項目	無	少	中	多	甚
さび病	発病株率	0	～20	～40	～60	～100
アブラムシ類	寄生株率	0	～25	～50	～75	～100
ネギハモグリバエ	被害株率(程度)	0	～25	～50	～75	～100
ネギアザミウマ	被害率率(程度)	0	～25	～50	～75	～100

※ ハモグリバエ、アザミウマの被害度＝(4A+3B+2C+D)÷(25×4)×100

- A：1株被害率率 ～100%
B：1株被害率率 ～50%
C：1株被害率率 ～30%
D：1株被害率率 ～10%

ネギえそ条斑病 発病程度別調査基準

発病程度A：全葉面積の31%以上に病斑が認められる。
発病程度B：全葉面積の21～30%に病斑が認められる。
発病程度C：全葉面積の11～20%に病斑が認められる。
発病程度D：全葉面積の1～10%に病斑が認められる。
発病程度E：病斑の発生が認められない。

$$\text{発病度} = \frac{1 \times 3B + 2C + D}{4 \times \text{調査株数}} \times 100$$