

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病、灰色かび病、モザイク病は発生を認めなかった(平年並)。
- 2 葉かび病は平年並であった。
- 3 うどんこ病は、発生を認めなかった(平年比少)。
- 4 アブラムシ類は発生を認めなかった(平年並)。
- 5 アザミウマ類は、50%のほ場で寄生花を認め、白ぶくれ果は例年比やや多かった。
- 6 コナジラミ類は、調査では発生を認めなかった(平年並)が、伏見1の調査外で成虫を認めた。
- 7 ハモグリバエ類は、平年並であった。
- 8 ハスモンヨトウは、発生を認めなかった(例年並)。
- 9 その他の病害虫の発生は認めなかった。

巡回調査結果 (令和2年6月15、16日)

25株・2複葉・2花・4果調査(単位: %、頭/葉)

	疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類		コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ		
	発病程度	発病程度	発病株率	発病程度	発病程度	寄生株率	寄生花率	白ぶくれ果率	寄生虫数	寄生葉率	被害葉率	被害株率	寄生株率	被害株率	
伏見1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
久御山1	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	10.0	3.0	0.00	0.0	2.0	4.0	0.0	0.0	
久御山2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
久御山3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-(花なし)	12.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
亀岡1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	2年	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	6.5	3.0	0.00	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0
	平年(例年)比	並	並	並	並	少	並	-	(やや多)	並	並	並	並	(並)	(並)
	平年(例年)値	0.0	2.0	0.1	6.6	3.5	1.3	9.2	2.8	0.0004	0.0	3.1	10.9	0.0	0.0
	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	24.6	3.6	0.000	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	10.3	1.0	0.000	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	1.0	1.6	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	0.0	0.0	10.2	10.6	0.0	0.8	8.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27年	0.0	0.0	0.0	19.0	7.0	0.0	-	1.2	0.000	0.0	28.0	57.6	0.0	0.0
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	1.2	0.004	0.4	0.0	12.8	0.0	0.0
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.6	-	-	0.000	0.0	0.0	0.8	-	-
	24年	0.0	0.0	0.8	4.4	0.4	2.4	-	-	0.000	0.0	2.8	18.4	-	-
23年	0.0	10.0	0.0	10.2	0.0	0.0	-	-	0.000	0.0	0.0	0.0	-	-	
22年	0.0	10.0	0.0	22.4	2.4	0.8	-	-	0.000	0.0	0.0	14.4	-	-	
ほ場率	2年	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	50.0	40.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	
	平年(例年)比	並	並	並	並	少	並	(並)		多	並	並	(並)		
	平年(例年)値	0.0	12.0	4.0	20.0	26.0	10.0	56.7		2.0	26.0	26.0	0.0		
	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0		0.0	20.0	20.0	0.0		
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	60.0		0.0	20.0	20.0	0.0		
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	28年	0.0	40.0	20.0	40.0	40.0	0.0	80.0		0.0	0.0	0.0	0.0		
	27年	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	0.0	20.0		0.0	80.0	80.0	0.0		
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0		20.0	20.0	20.0	0.0		
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0	-		0.0	20.0	20.0	-		
	24年	0.0	0.0	20.0	40.0	20.0	20.0	-		0.0	40.0	40.0	-		
23年	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	-		0.0	0.0	0.0	-			
22年	0.0	40.0	0.0	60.0	20.0	20.0	-		0.0	60.0	60.0	-			

(程度別基準)

	程度	無	少	中	多	甚
疫病	発病度	0	1~25	26~50	51~75	76以上
灰色かび病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
葉かび病、うどんこ病	発病度	0	1~20	21~40	41~60	61以上
アブラムシ類	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01~9	10~29	30~59	60以上
	寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	被害株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	白ぶくれ果率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上