

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病、灰色かび病、モザイク病、葉かび病、うどんこ病は、発生を認めなかった(平年並)。
- 2 アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- 3 アブラムシ類の発生を認めた(平年並、一口①)。
- 4 ハスモンヨトウは、発生を認めなかった(例年並)。
- 5 その他の病害虫は、発生を認めなかった。

巡回調査結果(令和元年5月13日)

25株・2複葉・4果調査(単位:%、頭/葉)

	疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類		コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ	
	発病 程度	発病 程度	発病 株率	発病 程度	発病 程度	寄生 株率	寄生 花率	白ぶくれ症 果率	寄生 虫数	寄生 葉率	被害 葉率	被害 株率	寄生 株率	被害 株率
伏見	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亀岡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	平年値	0.0	0.6	0.0	2.2	0.02	0.6	1.0	1.8	0.00	0.0	0.2	1.4	0.0
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.4	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	1.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	5.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	27年	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	2.4	-	0.0	0.00	0.0	2.0	8.0	0.0
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	25年	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00	0.0	0.0	4.8	-
	23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-
	22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-
	21年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00	0.0	0.0	0.0	-
ほ場率	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	平年値	0.0	6.7	0.0	4.4	2.2	13.3	15.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	29年	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	28年	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	27年	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	
	26年	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25年	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	40.0	0.0	-	
	23年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	
	22年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	
	21年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	

(程度別基準)

病害虫	程度	無	少	中	多	甚
疫病	発病度	0	1~25	26~50	51~75	76以上
灰色かび病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
葉かび病、うどんこ病	発病度	0	1~20	21~40	41~60	61以上
アブラムシ類	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01~9	10~29	30~59	60以上
	寄生株率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	被害株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	白ぶくれ症果率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上