

野菜

トマト（施設）

病害虫の発生状況

- 1 疫病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 2 灰色かび病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 モザイク病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 葉かび病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 うどんこ病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 アブラムシ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 7 アザミウマ類・・・・・・・・花で発生を認めなかった。
- 8 コナジラミ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 9 ハモグリバエ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 10 ハスモンヨトウ・・・・・・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 11 その他の病害虫・・・・・・・・発生を認めなかった。

トマト巡回調査結果〔(25株・2複葉・2花・4果調査(単位:%、頭/葉)) 調査日:令和4年3月16日

| 調査場所 | 疫病 | 灰色かび病 | モザイク病 | 葉かび病 | うどんこ病 | アブラムシ類 | アザミウマ類 | コナジラミ類 | ハモグリバエ類 | ハスモンヨトウ | | | | | |
|------------------|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| | 発病程度 | 発病程度 | 発病株率 | 発病程度 | 発病程度 | 寄生株率 | 寄生花率 | | | | 寄生果率 | 寄生虫数 | 寄生葉率 | 被害葉率 | 被害株率 |
| 京都市伏見区 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 久御山町① | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 久御山町② | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 久御山町③ | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 亀岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | R4年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 平年(例年)比 | 並 | - | 並 | 並 | 並 | 並 | - | 並 | 並 | 並 | 並 | (並) | (並) | |
| | 平年(例年) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | R3年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | R2年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H31年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H30年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H29年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H28年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H27年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H26年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H25年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| | H24年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 発生 ほ場率 (%) | R4年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年(例年)比 | 並 | - | 並 | 並 | 並 | 並 | - | 並 | 並 | 並 | 並 | (並) | (並) | |
| | 平年(例年) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | R3年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | R2年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H31年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H30年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H29年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H28年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H27年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H26年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | H25年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| | H24年 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |

(程度別基準)

| | 程度 | 無 | 少 | 中 | 多 | 甚 |
|------------|------------|---|--------|-------|-------|------|
| 疫病 | 発病度 | 0 | 1~25 | 26~50 | 51~75 | 76以上 |
| 灰色かび病 | 発病度 | 0 | 1~20 | 21~40 | 41~70 | 71以上 |
| モザイク病 | 発病株率(%) | 0 | 1~20 | 21~40 | 41~70 | 71以上 |
| 葉かび病、うどんこ病 | 発病度 | 0 | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61以上 |
| アブラムシ類 | 寄生株率(%) | 0 | 1~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 |
| コナジラミ類 | 寄生成虫数(頭/葉) | 0 | 0.01~9 | 10~29 | 30~59 | 60以上 |
| | 寄生葉率(%) | 0 | 1~30 | 31~50 | 51~80 | 81以上 |
| ハスモンヨトウ | 寄生株率(%) | 0 | 1~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 |
| | 被害株率(%) | 0 | 1~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 |
| アザミウマ類 | 寄生花率(%) | 0 | 1~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 |
| | 白ぶくれ症果率(%) | 0 | 1~5 | 6~15 | 16~30 | 31以上 |