

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病……………発生を認めなかった(平年並)。
- 2 灰色かび病……………発生を認めなかった(平年並)。
- 3 モザイク病……………発生を認めなかった(平年並)。
- 4 葉かび病……………発生を認めなかった(平年並)。
- 5 うどんこ病……………平年比多かった。
- 6 アブラムシ類……………発生を認めなかった(平年並)。
- 7 アザミウマ類……………例年比やや多かった。
- 8 コナジラミ類……………発生を認めなかった(平年並)。
- 9 ハモグリバエ類……………発生を認めなかった(平年並)。
- 10 ハスモンヨトウ……………発生を認めなかった(例年並)。
- 11 その他の病害虫……………亀岡市で果実にタバコガ類の被害を認めた。

トマト巡回調査結果〔(25株・2複葉・2花・4果調査(単位: %、頭/葉)) 調査日: 令和4年6月13、14、16日

	疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類		コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ	
	発病 程度	発病 程度	発病 株率	発病 程度	発病 程度	寄生 株率	寄生 花率	白ぶくれ症 果率	寄生虫 数(/株)	寄生 葉率	被害 葉率	被害 株率	寄生 株率	被害 株率
京都市伏見区	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町①	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	8.8	4.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町②	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	39.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
亀岡市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-(花なし)	19.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	10.5	12.4	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0
	平年(例年)比	並	並	並	並	多	並	(やや多)	(多)	並	並	並	やや少	(並)
	平年(例年)	0.0	0.0	0.1	3.5	4.0	1.2	9.1	3.2	0.0012	0.08	3.2	9.5	0.0
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	11.7	5.6	0.008	0.40	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	6.5	3.0	0.000	0.00	0.4	0.8	0.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	24.6	3.6	0.000	0.00	0.5	3.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	10.3	1.0	0.000	0.00	0.0	2.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	1.0	1.6	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0
	H28年	0.0	0.0	0.0	10.2	10.6	0.0	0.8	8.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0
	H27年	0.0	0.0	0.0	19.0	7.0	0.0	-	1.2	0.000	0.00	28.0	57.6	0.0
	H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	1.2	0.004	0.40	0.0	12.8	0.0
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.6	-	-	0.000	0.00	0.0	0.8	-	
H24年	0.0	0.0	0.0	4.4	0.4	2.4	-	-	0.000	0.00	2.8	18.4	-	
ほ場率	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	50.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年(例年)比	並	並	並	並	多	並	(並)	(並)	並	並	やや少	(並)	
	平年(例年)	0.0	4.0	4.0	10.0	28.0	8.0	60.0	60.0	4.0	4.0	22.0	0.0	
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	20.0	0.0	
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	20.0	0.0	
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H28年	0.0	40.0	20.0	40.0	40.0	0.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	H27年	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	80.0	0.0	
	H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0	-	-	0.0	0.0	20.0	-		
H24年	0.0	0.0	20.0	40.0	20.0	20.0	-	-	0.0	0.0	40.0	-		

(程度別基準)

	程 度	無	少	中	多	甚
疫病	発病度	0	1~25	26~50	51~75	76以上
灰色かび病	発病度	0	1~20	21~40	41~70	71以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
葉かび病、うどんこ病	発病度	0	1~20	21~40	41~60	61以上
アブラムシ類	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01~9	10~29	30~59	60以上
	寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	被害株率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1~10	11~20	21~40	41以上
	白ぶくれ症果率(%)	0	1~5	6~15	16~30	31以上