

発生防止のために農場の緊急消毒を実施します！


～消石灰が到着次第、消毒をお願いします～

➤ 高知県と香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認(国内27、28例目)

高病原性鳥インフルエンザ発生状況 (R2年シーズン)

★ 家きん (11県28事例)

都道府県	発生戸数	殺処分羽数
香川県	12戸	約 176.4 万羽
福岡県	1戸	約 9.2 万羽
兵庫県	1戸	約 14.5 万羽
宮崎県	7戸	約 40.0 万羽
奈良県	1戸	約 7.7 万羽
広島県	1戸	約 13.8 万羽
大分県	1戸	約 5.6 万羽
和歌山県	1戸	約 6.7 万羽
岡山県	1戸	約 64.2 万羽
滋賀県	1戸	約 1.1 万羽
高知県	1戸	約 3.2 万羽
計	28戸	約 342.4 万羽



● 野鳥等 (7道県16事例)

北海道、鹿児島県、新潟県、宮崎県、和歌山県、岡山県、鳥取県

新情報

香川県三豊市 肉用鶏 約1.4万羽 (12/16) 疫学関連農場1戸 (1.5万羽)

国内28例目

高知県宿毛市 採卵鶏 約3.2万羽 (12/16) 国内27例目

今季国内初発の高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性解析結果 (農研機構)

○鶏への接種試験の結果、今季流行しているウイルスは鶏に対して高い致死性を示すものの、死亡するまでの期間が長い傾向が認められた。

・鶏5羽にウイルスを経鼻接種し全羽が死亡するまでの期間

香川 2018 株(3日間)、香川 2020 株(6日間)

○早期発見には、農場での死亡羽数の増加に十分な注意を払うことが必要

○死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田 371-2
TEL 0773-25-1860 FAX 0773-25-1861 (24時間受付)