

韓国で口蹄疫の発生を確認!

今一度、本病の発生予防を徹底しましょう!

京畿道安城市の約120頭飼養の乳牛農家で、韓国において、約10か月ぶりに口蹄疫（O型）の発生がありました。

平成22年の宮崎県の発生事例でも、直前に韓国での発生があり、またこれから春節を迎え、これまで以上に人の往来や物流が盛んになることから、国内への口蹄疫侵入のリスクが高い状態と考えられます。

再度、飼養衛生管理基準に基づき農場におけるウイルス侵入防止対策の徹底をお願いします。

韓国の発生状況

1月28日：牛20頭で流涎、水泡など口蹄疫の臨床症状を示したため、通報

1月29日：精密検査で口蹄疫（O型）と確定

※直近の口蹄疫発生：昨年3/26～4/1に
京畿道金浦市豚農家で2件（A型）が発生



発生予防の徹底をお願いします！

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場に持ち込む**物品**や**出入りする車両の消毒**を徹底しましょう。
- 農場や畜舎の出入口に**踏込消毒槽等**を設置することにより、出入りする人の**靴底の消毒**を徹底しましょう。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これら国の**農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないように**しましょう。
- 毎日、飼養家畜の健康観察**を行いましょう。



効果的な消毒を実施しましょう！

◎ 効果的な消毒のポイント

- ・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れてしまうことから、**まずは汚れを落としてから消毒**すること。また、**消毒薬が汚れている**ことに気づいたら、**直ちに交換**すること。
- ・ 農場に出入りする車両の消毒では、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分**や**運転席の足元スペース**も可能な限り消毒すること。

《要注意》

- ★**口蹄疫**ウイルスに有効な**炭酸ソーダ**が**家畜保健衛生所**にありますので、ご相談ください
- ★**酸性**と**アルカリ性**の消毒薬の**同時使用**は**消毒効果が弱まります**！

推奨される
踏込消毒槽の設置方法



②
消毒液
の槽



①
水洗
の槽

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**よだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水ぶくれ**ができるのが主な特徴です。

～牛の症状～



～豚の症状～



写真：宮崎県提供

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

連絡先：**京都府中丹家畜保健衛生所** 福知山市字半田371-2
TEL:0773-25-1860(夜間・休日も転送機能で連絡可能)