

岐阜県（国内34例目）で 高病原性鳥インフルエンザ発生！！

岐阜県美濃加茂市で高病原性鳥インフルエンザ（H5亜型）が確認されました。

【発生農場の概要】 岐阜県美濃加茂市 採卵鶏 約6.8万羽


【経緯】（1月1日）インフルエンザ簡易検査陽性

（1月2日）遺伝子検査で疑似患畜確認（H5亜型）

野鳥での発生状況
8道県20事例
（12/24時点）

令和2年度の発生状況（高病原性鳥インフルエンザ 14県34事例）

地区	都道府県	例数	飼養状況(関連農場含む)
関西	滋賀県	1	採卵鶏 約 1.0 万羽
	兵庫県	1	採卵鶏 約 14.5 万羽
	奈良県	1	採卵鶏 約 7.7 万羽
	和歌山県	1	採卵鶏 約 6.8 万羽
四国	徳島県	1	採卵鶏 約 0.8 万羽
	香川県	13	採卵鶏 肉用鶏 肉用種鶏 約 179.0 万羽
	高知県	1	採卵鶏 約 2.7 万羽
中国	岡山県	1	採卵鶏 約 64.5 万羽
	広島県	1	採卵鶏 約 13.7 万羽
九州	福岡県	1	肉用鶏 約 9.2 万羽
	大分県	1	肉用鶏 約 5.6 万羽
	宮崎県	9	肉用鶏 肉用種鶏 採卵鶏 約 56.6 万羽
中部	岐阜県	1	採卵鶏 約 6.8 万羽
関東	千葉県	1	採卵鶏 約 116.0 万羽
計		34	約 484.9 万羽



1/2 高病原性鳥インフルエンザ発生地点

● 家きん
★ 野鳥

今シーズンの本病ウイルス株は感染から死亡するまでの期間が長く、
症状の発見前にまん延してしまう可能性があります！！

飼養衛生管理基準遵守徹底！！ 毎日の健康観察と早期発見・通報！！

特定症状(以下の症状を確認したら直ちに通報してください)

- 同一の家きん舎内で1日の死亡率が過去21日間平均の2倍以上
- まとまって死亡又はまとまってうずくまっている、鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、元気消失・沈うつ、食欲減退、産卵率低下等
- 鳥インフルエンザ検査でウイルス抗原及び抗体確認