

鹿児島県（国内36例目）で 高病原性鳥インフルエンザ発生！

鹿児島県さつま町で高病原性鳥インフルエンザ（H5亜型）が確認されました。

【発生農場の概要】 鹿児島県さつま町 肉用鶏 約3.3万羽


【経緯】（1月12日）簡易検査陽性

（1月13日）遺伝子検査で疑似患畜確認（H5亜型）

野鳥での発生状況
10道県27事例
（1/12時点）

令和2年度の発生状況（高病原性鳥インフルエンザ 15県36事例）

地区	都道府県	例数	飼養状況（関連農場含む）		
関西	滋賀県	1	採卵鶏	約 1.0	万羽
	兵庫県	1	採卵鶏	約 14.5	万羽
	奈良県	1	採卵鶏	約 7.7	万羽
	和歌山県	1	採卵鶏	約 6.8	万羽
四国	徳島県	1	採卵鶏	約 0.8	万羽
	香川県	13	採卵鶏 肉用鶏 肉用種鶏	約 179.0	万羽
	高知県	1	採卵鶏	約 2.7	万羽
中国	岡山県	1	採卵鶏	約 64.5	万羽
	広島県	1	採卵鶏	約 13.7	万羽
九州	福岡県	1	肉用鶏	約 9.2	万羽
	大分県	1	肉用鶏	約 5.6	万羽
	宮崎県	9	肉用鶏 肉用種鶏 採卵鶏	約 56.6	万羽
	鹿児島県	1	肉用鶏	約 3.3	万羽
中部	岐阜県	1	採卵鶏	約 6.8	万羽
関東	千葉県	2	採卵鶏	約 231.0	万羽
計		36		約 603.2	万羽



- ・衛生レベルの高い農場でも発生しています。
- ・畜舎に入る時は必ず専用長靴や着衣を使用し、更衣時には消毒等の交差汚染の防止対策を徹底してください。
- ・日々畜舎内外の消毒を徹底してください。

現状より更に衛生レベルを高めて、大切な家きんを守り抜きましょう！

特定症状（以下の症状を確認したら直ちに通報してください）

- ・ 同一の家きん舎内で1日の死亡率が過去21日間平均の2倍以上
- ・ まとまって死亡又はまとまってうずくまっている、鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、元気消失・沈うつ、食欲減退、産卵率低下等）
- ・ 鳥インフルエンザ検査でウイルス抗原及び抗体確認