

どこで発生してもおかしくない状況です！

～最大限の警戒をお願いします～

- ▶ 茨城県、鹿児島県の家きんで高病原性鳥インフルエンザ発生（国内73,74例目）
- ▶ 兵庫県神戸市の死亡野鳥からインフルエンザウイルス検出


高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）

★ 家きん（25道県74事例）

| 都道府県 | 発生戸数 | 飼養羽数 | 都道府県 | 発生戸数 | 飼養羽数 |
|------|------|-----------|------|------|-------------|
| 岡山県 | 4 戸 | 約 73.7 万羽 | 鳥取県 | 1 戸 | 約 11.0 万羽 |
| 北海道 | 2 戸 | 約 32.0 万羽 | 愛知県 | 2 戸 | 約 31.1 万羽 |
| 香川県 | 4 戸 | 約 15.8 万羽 | 佐賀県 | 1 戸 | 約 3.0 万羽 |
| 茨城県 | 5 戸 | 約319.5 万羽 | 山形県 | 1 戸 | 約 2.7 万羽 |
| 和歌山県 | 2 戸 | 約 4.6 万羽 | 広島県 | 6 戸 | 約 168.7 万羽 |
| 兵庫県 | 1 戸 | 約 4.4 万羽 | 沖縄県 | 1 戸 | 約 4.5 万羽 |
| 鹿児島県 | 13 戸 | 約134.5 万羽 | 埼玉県 | 4 戸 | 約 46.2 万羽 |
| 新潟県 | 3 戸 | 約155.5 万羽 | 福岡県 | 3 戸 | 約 9.0 万羽 |
| 宮崎県 | 3 戸 | 約 31.0 万羽 | 長崎県 | 1 戸 | 約 2.7 万羽 |
| 青森県 | 2 戸 | 約149.2 万羽 | 群馬県 | 3 戸 | 約 51.8 万羽 |
| 宮城県 | 2 戸 | 約 3.3 万羽 | 大分県 | 1 戸 | 約 1.3 万羽 |
| 千葉県 | 5 戸 | 約 64.0 万羽 | 滋賀県 | 2 戸 | 約 0.4 万羽 |
| 福島県 | 2 戸 | 約 11.7 万羽 | 計 | 74 戸 | 約 1331.6 万羽 |

疫学関連農場

| 都道府県 | 発生戸数 | 飼養羽数 |
|------|------|-----------|
| 新潟県 | 1 戸 | 約 0.6 万羽 |
| 青森県 | 1 戸 | 約 0.8 万羽 |
| 香川県 | 3 戸 | 約 2.9 万羽 |
| 鹿児島県 | 2 戸 | 約 8.2 万羽 |
| 山形県 | 1 戸 | 約 4.0 万羽 |
| 愛知県 | 1 戸 | 約 0.1 万羽 |
| 宮崎県 | 1 戸 | 約 10.0 万羽 |
| 大分県 | 2 戸 | 約 4.3 万羽 |
| 滋賀県 | 1 戸 | 約 40 羽 |
| 岩手県 | 1 戸 | |
| 宮城県 | 1 戸 | 約 500 羽 |
| 熊本県 | 1 戸 | |
| 計 | 16 戸 | 約 31.0 万羽 |



予防対策を徹底して下さい。

- ◆ 消毒の徹底（鶏舎出入り時の手指・長靴消毒、鶏舎周囲に消石灰散布等）
- ◆ 野生動物対策（ネットやカーテンの設置・破損の有無の点検・修繕等）
- ◆ 専用靴等の設置（鶏舎専用の靴・衣服の設置等）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。