

# 日脳・パルボの予防接種をしましょう

## 日本脳炎

コガタアカイエカが媒介し、免疫のない妊娠豚が感染すると死流産や黒子等の異常産を起こします。種雄豚の場合は精巣炎をおこし不妊の原因にもなります。

## 豚パルボウイルス感染症

感染豚との接触や汚染器具を介して感染が広がる為、年間を通じて発生します。感染すると日本脳炎同様異常産を引き起こします。




日本脳炎によるミイラ化胎子・白子・黒子  
(農研機構HP)

## ★予防するために・・・

日本脳炎は蚊が媒介するため、蚊が活動し始める1か月前(4～5月)にワクチン接種を済ませておきましょう。日本脳炎とパルボウイルスの混合ワクチンも市販されています。

## ★ワクチンの使用方法(一例)



※ワクチンの接種については、かかりつけの獣医師にご相談ください

※メーカーによって使用方法が異なりますので、使用説明書に従い  
ワクチン接種を実施してください

※特に、初めて夏を迎える繁殖候補豚には忘れずに接種しましょう！



～家畜に異常を認めたら、直ちに当所に連絡願います～

京都府南丹家畜保健衛生所 TEL:0771-42-3308(夜間・休日も転送機能で連絡可能)