



薬食審査発 0725 第 1 号
平成 25 年 7 月 25 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長
(公 印 省 略)

医薬品の一般的名称について

標記については、「医薬品の一般的名称の取扱いについて」(平成 18 年 3 月 31 日薬食発第 0331001 号厚生労働省医薬食品局長通知) 等により取り扱っているところであるが、今般、我が国における医薬品一般的名称（以下「JAN」という。）について、新たに別添のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係業者に周知方よろしく御配慮願いたい。

なお、「医薬品の一般的名称について」(平成 25 年 4 月 1 日薬食審査発 0401 第 1 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知) の別添中、登録番号 24-1-B2 の記載内容について、別紙のとおり訂正するので、併せて御留意願いたい。

(参照)

日本医薬品一般名称データベース：URL <http://jpdb.nihs.go.jp/jan/Default.aspx>
(別添の情報のうち、JAN 以外の最新の情報は、当該データベースの情報で対応することとしています。)

別添


別表1 INNとの整合性が図られる可能性のあるもの

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知に示す別表1)

登録番号 24-2-A3

JAN(日本名) : アレクチニブ塩酸塩

JAN(英名) : Alectinib Hydrochloride



C₃₀H₃₄N₄O₂ · HCl

9-エチル-6,6-ジメチル-8-[4-(モルホリン-4-イル)ピペリジン-1-イル]-11-オキソ-6,11-ジヒドロ-5H-ベンゾ[b]カルバゾール-3-カルボニトリル 塩酸塩

9-Ethyl-6,6-dimethyl-8-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile monohydrochloride

別表2 INNに収載された品目の我が国における医薬品一般的の名称

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知に示す別表2)

登録番号 23-5-B6

JAN(日本名) : ペグフィルグラストム(遺伝子組換え)


JAN(英名) : Pegfilgrastim (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

MTPLGPASSL PQSFLLKCLE QVRKIQGDGA ALQEKL^{CATY} KLCHPEELVL
LGHSLGIPWA PLSSCPSQAL QLAGCLSQLH SGLFLYQGLL QALEGISPEL
GPTLDLQLD VADFTTIWQ QMEEELGMAPA LQPTQGAMPA FASAFQRAG
GVLVASHLQS FLEVSYRVLR HLAQP

M1: PEG化部位

PEG結合:



C₈₄₅H₁₃₃₉N₂₂₃O₂₄₃S₉

ペグフィルグラストムは、メトキシポリエチレングリコール(分子量: 約20,000)1分子がフィルグラストム(遺伝子組換え)のMet1のアミノ基に結合した修飾タンパク質(分子量: 約40,000)である。

Pegfilgrastim is a modified protein (molecular weight: ca. 40,000) consisting of a methoxy polyethylene glycol molecule (molecular weight: ca. 20,000) attached to an amino group of Met1 of Filgrastim (Genetical Recombination).

登録番号 23-5-B8

JAN (日本名) : ブレンツキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Brentuximab Vedotin (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

L鎖のアミノ酸配列 (Asp¹ – Cys²¹⁸)

DIVLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCKASQSVD FDGDSYMNWY QQKPGQPPKV
LIYAASNLES GIPARFSGSG SGTDFTLNH PVVEEDAATY YCQQSNEDPW
TFGGGTKLEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV
QWKVDNALQG GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV
THQGLSSPVT KSFNRGEC

H鎖のアミノ酸配列 (Gln¹ – Lys⁴⁴⁷)

QIQLQQSGPE VVKPGASVKI SCKASGYTFT DYYITWVKQK PGQGLEWIGW
IYPGSGNTKY NEKFKGKATL TVDTSSSTAF MQLSSLTSED TAVYFCANYG
NYWFAYWGQG TQVTVSAAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF
PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGTQTYIC
NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT
LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNNAKTK PREEQYNSTY
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT
LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPPVLD
DGSEFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPG(K)

H鎖 Q1 : 部分的ピログルタミン酸


L鎖 C218, H鎖 C220, H鎖 C226, H鎖 C229 : 薬物結合可能部位

H鎖 N297 : 糖鎖結合


H鎖 K447 : 部分的プロセシング

L鎖 C218-H鎖 C220, H鎖 C226-H鎖 C226, H鎖 C229-H鎖 C229 : ジスルフィド結合

主な糖鎖構造



ベドチンの構造式



$C_{6488}H_{9954}N_{1694}O_{2032}S_{40}$

H鎖 $C_{2203}H_{3379}N_{569}O_{671}S_{14}$

L鎖 $C_{1041}H_{1602}N_{278}O_{345}S_6$

ブレンツキシマブ ベドチンは、抗体薬物複合体（分子量：約 153,000）であり、遺伝子組換えモノクローナル抗体（分子量：約 148,000）の平均 3~5 個の Cys 残基に、モノメチルアウリスタチン E ($\{(S)\text{-}1\text{-}\{((S)\text{-}1\text{-}\{[(3R,4S,5S)\text{-}1\text{-}\{(S)\text{-}2\text{-}\{[(1R,2R)\text{-}3\text{-}\{[(1S,2R)\text{-}1\text{-}\text{ヒドロキシ}\text{-}1\text{-}\text{フェニルプロパン}\text{-}2\text{-}\text{イル})\text{アミノ}\}]}\text{-}1\text{-}\text{メトキシ}\text{-}2\text{-}\text{メチル}\text{-}3\text{-}\text{オキソプロピル}\}\text{ピロリジン}\text{-}1\text{-}\text{イル}\}\text{-}3\text{-}\text{メトキシ}\text{-}5\text{-}\text{メチル}\text{-}1\text{-}\text{オキソヘプタン}\text{-}4\text{-}\text{イル}\}[\text{メチル}\text{アミノ}\}\text{-}3\text{-}\text{メチル}\text{-}1\text{-}\text{オキソブタン}\text{-}2\text{-}\text{イル}\}(\text{メチル}\text{アミン})\text{に}4\text{-}\{(S)\text{-}2\text{-}\{[(2,5\text{-ジオキソ}\text{-}2,5\text{-ジヒドロ}\text{-}1H\text{ピロール}\text{-}1\text{-}\text{イル})\text{ヘキサン}\text{アミド}\}\text{-}3\text{-}\text{メチルブタノアミド}\}\text{-}5\text{-}\text{ウレイドペントンアミド}\}\text{ベンジルオキシカルボニル基がリンカーとして結合しているベドチン} (1\text{-}\{6\text{-}\{[(2S)\text{-}1\text{-}\{[(2S)\text{-}5\text{-}\text{カルバモイルアミノ}\}\text{-}1\text{-}\{[(2S)\text{-}1\text{-}\{[(3R,4S,5S)\text{-}1\text{-}\{(2S)\text{-}2\text{-}\{[(1R,2R)\text{-}3\text{-}\{[(1S,2R)\text{-}1\text{-}\text{ヒドロキシ}\text{-}1\text{-}\text{フェニルプロパン}\text{-}2\text{-}\text{イル})\text{アミノ}\}\text{-}1\text{-}\text{メトキシ}\text{-}2\text{-}\text{メチル}\text{-}3\text{-}\text{オキソプロピル}\}\text{ピロリジン}\text{-}1\text{-}\text{イル}\}\text{-}3\text{-}\text{メトキシ}\text{-}5\text{-}\text{メチル}\text{-}1\text{-}\text{オキソヘプタン}\text{-}4\text{-}\text{イル}\}(\text{メチル}\text{アミノ})\text{-}3\text{-}\text{メチル}\text{-}1\text{-}\text{オキソブタン}\text{-}2\text{-}\text{イル}\}]\text{メチルカルバモイルオキシメチルフェニル}\text{アミノ}\}\text{-}1\text{-}\text{オキソペントン}\text{-}2\text{-}\text{イル}\}]\text{アミノ})\text{-}3\text{-}\text{メチル}\text{-}1\text{-}\text{オキソブタン}\text{-}2\text{-}\text{イル}\}$

ル]アミノ}-6-オキソヘキシル)-2,5-ジオキソピロリジン-3-イル基(C₆₈H₁₀₆N₁₁O₁₅; 分子量: 1317.63)が結合している。

抗体部分は、キメラモノクローナル抗体で、マウス抗ヒト CD30 抗体の可変部及びヒト IgG1 の定常部からなり、チャイニーズハムスター卵巣細胞で產生される。タンパク質部分は、447 個のアミノ酸残基からなる H鎖(γ1鎖) 2分子及び 218 個のアミノ酸残基からなる L鎖(κ鎖) 2分子で構成される糖タンパク質である。

Brentuximab Vedotin is an antibody-drug-conjugate (molecular weight: ca. 153,000) consisting of Vedotin(1-(6-{[(2S)-1-((2S)-5-carbamoylamino-1-[(4-{[(2S)-{[(2S)-1-[(3R,4S,5S)-1-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-{[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino}-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl}-3-methoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-yl](methyl)amino}-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino}-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)methylcarbamoyloxy}methylphenyl)amino]-1-oxopentan-2-yl}amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino}-6-oxohexyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl group (C₆₈H₁₀₆N₁₁O₁₅; molecular weight: 1317.63)), which is composed of monomethyl auristatin E ([(S)-1-[(S)-1-[(3R,4S,5S)-1-((S)-2-[(1R,2R)-3-{[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino}-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl}-3-methoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-yl][methyl]amino}-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl](methyl)amine) and 4-((S)-2-[(S)-2-[6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanamido]-3-methylbutanamido}-5-ureidopentanamido)benzyloxycarbonyl linker, attached to an average of 3-5 Cys residues of a recombinant monoclonal antibody (molecular weight: ca. 148,000). The monoclonal antibody moiety is a chimeric monoclonal antibody composed of variable regions derived from a mouse anti-human CD30 monoclonal antibody and constant regions derived from a human IgG1 and produced in Chinese hamster ovary cells. The protein moiety is a glycoprotein composed of 2 H-chain (γ1-chain) molecules consisting of 447 amino acid residues each and 2 L-chain (κ-chain) molecules consisting of 218 amino acid residues each.

登録番号 24-1-B4

JAN (日本名) : ソラネズマブ (遺伝子組換え)

JAN (英 名) : Solanezumab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

L鎖

DVVMQTQSPLS LPVTLGQPAS ISCRSSQSLI YSDGNAYLHW FLQKPGQSPR
LLIYKVSNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQSTHVP
WTFGQGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEHKVYACE
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC

H鎖


EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS RYSMSWVRQA PGKGLELVAQ
INSVGNSTYY PDTVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCASGD
YWGQGTLVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL VKDYFPEPVT
VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTVPSSLGT QTYICNVNHK
PSNTKVDKKV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR
TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV
LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR
DELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF
LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GK


H鎖 N56, H鎖 N292 : 糖鎖結合 ; H鎖 K442 : 部分的プロセシング

L鎖 C219-H鎖 C215, H鎖 C221-H鎖 C221, H鎖 C224-H鎖 C224 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造

N56





C₆₄₀₈H₉₉₄₄N₁₇₁₆O₁₉₉₈S₄₂

H鎖 : C₂₁₄₁H₃₃₂₇N₅₇₁O₆₆₂S₁₅

L鎖 : C₁₀₆₃H₁₆₄₉N₂₈₇O₃₃₇S₆


ソラネズマブは、遺伝子組換えヒト化モノクローナル抗体であり、マウス抗ヒトアミロイドベータペプチド可溶性モノマーに対する抗体の相補性決定部、並びにヒト IgG1 のフレームワーク部及び定常部からなる。ソラネズマブは、チャイニーズハムスター卵巣細胞により産生される。ソラネズマブは、442 個のアミノ酸残基からなる H鎖 (γ1鎖) 2 分子及び 219 個のアミノ酸残基からなる L鎖 (κ鎖) 2 分子で構成される糖タンパク質（分子量：約 151,000）である。

Solanezumab is a recombinant humanized monoclonal antibody composed of complementarity-determining regions derived from mouse anti-human amyloid beta peptide soluble monomer monoclonal antibody and framework regions and constant regions derived from human IgG1. Solanezumab is produced in Chinese hamster ovary cells. Solanezumab is a glycoprotein (molecular weight: ca.151,000) composed of 2 H-chain (γ1-chain) molecules consisting of 442 amino acid residues each and 2 L-chain (κ-chain) molecules consisting of 219 amino acid residues each.

登録番号 24-1-B12

JAN (日本名) : オラネキシジングルコン酸塩

JAN (英 名) : Olanexidine Gluconate



C₁₇H₂₇Cl₂N₅ · C₆H₁₂O₇



1-(3,4-Dichlorobenzyl)-5-octylbiguanide mono-D-gluconate

1-(3,4-ジクロロベンジル)-5-オクチルビグアニド 一-D-グルコン酸塩

登録番号 24-2-B2

JAN (日本名) : カバジタキセル アセトン付加物

JAN (英 名) : Cabazitaxel Acetonate



(2*R*,3*S*)-3-(1,1-ジメチルエチル)オキシカルボニルアミノ-2-ヒドロキシ-3-フェニルプロパン酸 (1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,5*R*,7*S*,8*S*,10*R*,13*S*)-4-アセトキシ-2-ベンゾイルオキシ-5,20-エポキシ-1-ヒドロキシ-7,10-ジメトキシ-9-オキソタキス-11-エン-13-イル アセトン付加物
(1*S*,2*S*,3*R*,4*S*,5*R*,7*S*,8*S*,10*R*,13*S*)-4-Acetoxy-2-benzoyloxy-5,20-epoxy-1-hydroxy-7,10-dimethoxy-9-oxotax-11-ene-13-yl (2*R*,3*S*)-3-(1,1-dimethylethyl)oxycarbonylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate monoacetonate

※ JAN以外の情報は、参考として掲載しました。

別表2 INNに収載された品目の我が国における医薬品一般的名称

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知
に示す別表2)

登録番号 24-1-B2

誤	正
JAN(日本名) : Odanacatib	JAN(日本名) : オダナカチブ
JAN(英名) : オダナカチブ	JAN(英名) : Odanacatib