

三重県の捕獲野生いのししから 豚熱ウイルスを確認！

5月25日に三重県で捕獲された野生いのししから豚熱ウイルスが確認されました。京都府県境から10km以内での確認です。

栃木県・岩手県の養豚農場で豚熱が発生しているところです。
引き続き衛生対策の徹底と、異常の早期発見・早期通報をお願いします。

豚熱ウイルス陽性
いのしし捕獲地点



【豚熱の特定症状】

- 耳、下腹部、足等の紫斑(チアノーゼ)
- 40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
- 結膜炎、目やに
- けいれん、後ろ足の麻痺
- 皮下出血、血便

このような症状があれば、直ちに当所に通報して下さい。

管内の飼育豚、いのししにはワクチン接種をしていますが、油断せず衛生対策をしっかりと行い、感染のリスクを下げましょう！

以下について、いまいちど点検をお願いします！

- ☑ 毎日、豚やいのししの健康観察をしてください。異常があればすぐ通報！
- ☑ 出入りする車両や飼育施設周辺の消毒を徹底してください。
- ☑ 飼養衛生管理区域専用の衣服・長靴を着用してください。
- ☑ ネットや柵、コンパネなどを活用し、いのしし、ねずみなどの野生動物の侵入や接触の防止対策をしてください。
- ☑ 肉及び肉製品が含まれている可能性のある飼料は加熱給与してください。

(攪拌しながら90℃以上60分以上又はこれと同等 以上)

※ 攪拌しながら90℃で60分以上、又は95℃で19分以上、100℃で6分以上