

香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザを確認！！今季、香川県で初！（国内農場6例目） 徳島県の野鳥でも疑い事例！

11月7日に香川県三豊市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。また、徳島県（10月24日回収）の野鳥でも疑い事例がありました。

家きん飼養農場の皆様には、野鳥の侵入防止、鶏舎及び衛生管理区域内の消毒など飼養衛生管理基準に基づく発生予防対策の徹底をお願いします。（裏面参照）

【発生地；香川県三豊市】

- ・採卵鶏農場（飼養羽数；4. 2万羽）
 - ・11月7日、死亡鶏増加の報告を受け、県が立入検査
 - ・11月7日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認
- *疫学関連農場（香川県観音寺市、1農場
2. 8万羽）

-
- 農場と野鳥での発生
 - 農場での発生
 - 野鳥での発生

京都府山城家畜保健衛生所 TEL:0774-52-2040(夜間・休日転送)
FAX:0774-52-2030

飼養衛生管理基準の遵守状況の点検を！

鶏、あひるなど家きん飼養者の皆様へ

家きんを飼われている皆様には、野鳥の侵入防止、鶏舎及び衛生管理区域内の消毒など飼養衛生管理基準に基づく発生予防対策をお願いします。

特に、次の飼養衛生管理基準7項目の遵守状況を点検してください。

- ① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等（項目15）
- ② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目16）
- ③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等（項目17）
- ④ 鶏舎に立ち入る者の手指消毒等（項目25）
- ⑤ 鶏舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目26）
- ⑥ 鶏舎外での病原体の汚染防止（項目28）
- ⑦ 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒（項目32）

発生予防のポイント

農場に入る全ての

人・車両・物品の衛生対策



周囲にはウイルスがあると認識。
農場内・家きん舎内には入れない。

衛生管理区域・家きん舎ごとに
専用の長靴を着用



着替え・履き替えの前後で
交差しないよう境界を明確に。

ウイルスを媒介する

野生動物の侵入防止対策



「農場に近寄らせない」
「農場内に入れない」
「ネズミ・ハエ等の定期的な駆除」