

# ランピースキン病の感染拡大防止！ 車両や人による 農場から農場への伝播を防止しましょう

- ・ランピースキン病は、主にサシバ工等による機械的伝播により感染が拡大します。
- ・サシバ工等が車両に付着し、又は車内に侵入することにより他の地域に運搬されて感染が拡大する可能性も指摘されています。

## 【国内における発生状況（R6.12.19現在）】

- ・福岡県 4市 19農場
- ・熊本県 1地域 2農場

### 車両がウイルスを運ばないために

- 農場に出入りする**全ての車両**は**洗浄・消毒、殺虫**を徹底！
- 車内に入り込んだサシバ工等**も、**確実に殺虫**！

（特に寒い時期、サシバ工等は温かい車内に集まりやすく、車内にも侵入します。）

（資材（牧草ロールや敷料など）にもサシバ工等が入り込む可能性があるため、搬入時確認！）



車体に集まったハ工



車内に侵入したハ工

### 人がウイルスを運ばないために

- 農場ごとに**専用の衣服、長靴（ブーツカバー）**交換の徹底！
- 注射針、人工授精用器具等**は確実に一頭ごとに交換又は消毒！
- 聴診器等、皮膚に接触する器具**も適切に消毒！

#### 農場から農場への感染拡大防止！

