


# 野生いのししでの豚熱感染拡大！

## ～広島県、山口県の野生いのししで豚熱確認！～

3月17日に山口県岩国市で発見された死亡野生いのしし、3月20日に広島県大竹市で発見された衰弱野生いのししから豚熱が確認されました。山口県、広島県とも初めての確認であり、どちらもワクチン未接種地域です。

京都府内の野生いのししでも豚熱陽性が確認されています。

春を迎え、野生いのししの行動範囲が広がり、豚熱ウイルスの拡散が予想されます。引き続き飼養衛生管理基準を遵守し、豚やいのししを豚熱から守りましょう！



山口県の死亡いのしし確認地点から北に約4kmの地点が、広島県の捕獲いのしし確認地点です。

また、これまで豚熱陽性のいのししが確認された最西端は兵庫県丹波市でしたが、感染確認地域が一気に西へ拡大しました。

### 【豚熱の特定症状】

- 耳、下腹部、足等の紫斑(チアノーゼ)
- 40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
- 結膜炎、目やに
- けいれん、後ろ足の麻痺
- 皮下出血、血便

このような症状があれば、直ちに当所に通報して下さい

管内の飼育豚、いのししにはワクチン接種をしていますが、油断をせず、衛生対策をしっかり行い、感染のリスクを下げましょう！

以下について、いまいちど点検をお願いします！

- ☑ 毎日、豚やいのししの健康観察をしてください。異常があればすぐ通報！
- ☑ 出入りする車両や飼育施設周辺の消毒を徹底してください。
- ☑ 飼養衛生管理区域専用の衣服・長靴を着用してください。
- ☑ ネットや柵、コンパネなどを活用し、いのしし、ねずみなどの野生動物の侵入や接触の防止対策をしてください。
- ☑ 肉及び肉製品が含まれている可能性のある飼料は加熱給与してください。  
(攪拌しながら90℃以上60分以上又はこれと同等以上)

※ 攪拌しながら90℃で60分以上、又は95℃で19分以上、100℃で6分以上

家畜保健衛生所からのお願い: 定期報告の提出期限は4月15日です。まだの方は提出してください。

京都府山城家畜保健衛生所 TEL: 0774-52-2040(休日・夜間は転送されます。)  
FAX: 0774-52-2030

## 京都府内の野生いのししにおける豚熱感染状況

京都府内の野生いのししでも、豚熱感染が継続して確認されています。  
野生動物との接触防止対策をお願いします！！

例数	確定日	死亡・捕獲	捕獲又は発見場所	その他
111	2月 3日	捕獲	京都市北区	成獣、50kg
112	3月10日	死亡	伊根町菅野	成獣、♀、50kg
113	3月17日	捕獲	京丹波町曾根	幼獣、♀、15kg

## 全国の野生いのししにおける豚熱感染状況

都道府県名	検査頭数	陽性頭数	都道府県名	検査頭数	陽性頭数
宮城県	639	122	長野県	1,990	269
山形県	561	116	岐阜県	7,371	1,232
福島県	444	41	静岡県	6,598	364
茨城県	2,081	158	愛知県	3,440	146
栃木県	1,156	92	三重県	7,440	630
群馬県	2,754	135	滋賀県	1,663	294
埼玉県	1,748	121	京都府	508	113
東京都	211	9	大阪府	38	19
神奈川県	1,311	57	兵庫県	741	94
新潟県	598	47	奈良県	414	39
富山県	939	80	和歌山県	689	133
石川県	869	55	広島県	148	1
福井県	1,625	172	山口県	286	1
山梨県	501	79			

※ 上記以外の道県では確認されていません。

※ 数字は平成30年9月13日から令和4年3月22日までの累計です。